

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Pertudoron® 2 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Pertudoron® 2 beachten?
3. Wie ist Pertudoron® 2 einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pertudoron® 2 aufzubewahren?



Pertudoron® 2

Flüssige Verdünnung

Wirkstoff: Cuprum aceticum D3

Zusammensetzung

10 ml enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Cuprum aceticum Dil. D3 (D3 mit Ethanol 15 Gew.-%) 10 ml.

Pertudoron® 2 ist in Packungen zu 20 ml Flüssige Verdünnung erhältlich.

1. Was ist Pertudoron® 2 und wofür wird es angewendet?

Pertudoron® 2 ist ein anthroposophisches Arzneimittel von: Weleda AG, Postfach 1309 / 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-424, E-Mail: dialog@weleda.de

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehört zu den Anwendungsgebieten die Begleittherapie bei Neigung zu Krämpfen der glatten und quergestreiften Muskulatur, z.B. Keuchhusten, Krampfhusten, Bronchitis mit krampfartigen Zuständen, Bronchialasthma.

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was müssen sie vor der Anwendung von Pertudoron® 2 beachten?

Kinder

Bei Bronchialasthma soll Pertudoron® 2 bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum 3. Lebensjahr nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Pertudoron® 2

Pertudoron® 2 enthält 18 Vol.-% Alkohol.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist Pertudoron® 2 einzunehmen?

Nehmen Sie Pertudoron® 2 immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Pertudoron® 2 wird mit Wasser verdünnt eingenommen.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei Keuchhusten, Krampfhusten, Bronchitis mit krampfartigen Zuständen:

Pertudoron® 2 wird bei Keuchhusten, Krampfhusten, Bronchitis mit krampfartigen Zuständen in der Regel im Wechsel mit Pertudoron® 1 eingenommen. Die Menge und die Häufigkeit der Einnahme richtet sich nach dem Alter und dem Krankheitsstadium.

	Einzel-dosis	Häufigkeit im akuten Stadium im Wechsel mit Pertudoron® 1	Häufigkeit nach fortschreitender Besserung
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren	5 - 10 Tropfen	stündlich	2 - 3 mal täglich
Schulkinder von 6 - 12 Jahren	5 Tropfen	stündlich	2 - 3 mal täglich
Kleinkinder von 1 - 5 Jahren	5 Tropfen	alle 2 Stunden	2 - 3 mal täglich
Säuglinge im 1. Lebensjahr	3 Tropfen	alle 3 Stunden	2 - 3 mal täglich

Bei Bronchialasthma:

Bei Bronchialasthma erfolgt die Einnahme ohne Wechsel mit Pertudoron® 1 nach folgendem Schema:

	Einzel-dosis	Häufigkeit der Einnahme
Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren	5 - 10 Tropfen	2 - 3 mal täglich
Kleinkinder von 3 - 5 Jahren	3 - 5 Tropfen	2 - 3 mal täglich

Wie lange soll Pertudoron® 2 angewendet werden?

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von Pertudoron® 2 vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Pertudoron® 2 Nebenwirkungen haben.

Sehr selten kann nach der Einnahme von Pertudoron® 2 Brechreiz auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. Wie ist Pertudoron® 2 aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen: Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Aufbewahrung.

Stand der Information: Oktober 2005